


SedPall: Von der Anxiolyse bis zu tiefer kontinuierlicher Sedierung



Bundesministerium
für Bildung
und Forschung

Methodische Vorgehensweise und Kernergebnisse aus dem
Teilprojekt 1. Quantitative Datenerfassung.

Sandra Kurkowski & Jorge Luis Torres Cavazos



Quantitative Datenerfassung Rekrutierungszentren

- **Ziel:** Überblick der klinischen Praxis
- **Methode:** Quantitative Datenerfassung mittels retrospektiver Durchsicht von Akten (Patient:innen)
- **Rekrutierungszentren:** 9 Einrichtungen der SPV
 - 6 Palliativstationen
 - 3 SAPV-Teams



Quantitative Datenerfassung

Übersicht

- 1.132 Akten von Patient:innen
 - SAPV n = 257 | SSPV n = 875
- Tumorerkrankung
 - SAPV 68% | SSPV 72%
- Verstorben
 - SAPV 87% | SSPV 65%
- Alter
 - 21 – 101 Jahre
 - Mittelwert 72 Jahre



Quantitative Datenauswertung

Soziodemographische Daten

■ Vorherige Behandlung / Zuweisung

- SAPV: ambulant 67% stationär 28 %
- SSPV: ambulant 28% stationär 71%

■ ECOG

▪ SAPV

21% ECOG 4

23% ECOG 3

SSPV

48 % ECOG 4

26 % ECOG 3



Quantitative Datenauswertung

Weiterführende Auswertungen

- **Insgesamt**
 - 27 Medikamente
- **(Einzelne) Medikamentengaben**
 - 35.850
- **Meist gegeben**
 - Hydromorphon
 - Midazolam
 - Morphin
 - Lorazepam
 - Fentanyl
 - Haloperidol

SAPV	SSPV
Clonidin	Clonidin
Pipamperon	Pipamperon
Midazolam	Midazolam
Fentanyl	Fentanyl
Melperon	Melperon
Haloperidol	Haloperidol
Ketamin	Ketamin
Morphin	Morphin
Levomepromazin	Levomepromazin
Buprenorphin	Buprenorphin
Hydromorphon	Hydromorphon
Quetiapin	Quetiapin
Lorazepam	Lorazepam
Diazepam	Diazepam
Oxazepam	Oxazepam
Risperidon	Risperidon
Piritramid	Piritramid
Oxycodon	Propofol
Bromazepam	SKetamin
	LevoMethadon
	Opipramol
	Temazepam
	Promethazin
	Methadon
	Tapentadol



Quantitative Datenauswertung

Dokumentierte Sedierung(en)

■ Insgesamt

- 45 Sedierungen (35 kontinuierlich und 8 intermittierend)

■ SAPV

- Anzahl: 3 (1%)
- Dauer: 2-4 Tage, (Median: 3)

■ SSPV

- Anzahl: 42 (5%)
- Dauer: 1-10 Tage, (Median: 2)


■ Indikation: Therapierefraktäre Symptome n=39

- Schmerzen n = 5, Unruhe n = 4, Luftnot n = 2




Tägliche Dosis Midazolam in mg (Regelmedikation, SSPV)

Midazolam in der SSPV
Pat. ohne Sed




Verwendung Midazolam


Midazolam in der SSPV zur Symptomkontrolle




Prozentangabe der Verstorbenen die Midazolam erhielten



Tägliche Dosis Midazolam in mg (Regelmedikation, SSPV)



Tägliche Dosis Midazolam in mg (Regelmedikation, SSPV)



Kontakt Daten für Rückfragen

- Prof. Dr. Christoph Ostgathe
christoph.ostgathe@uk-erlangen.de
- PD Dr. Carsten Klein
carsten.klein@uk-erlangen.de
- Sandra Kurkowski
sandra.kurkowski@uk-erlangen.de
- Jorge Luis Torres Cavazos
jorgeLuis.TorresCavazos@uk-erlangen.de

